

## Priprema crijeva sa Colophos-om

**Ne preporucje se bolesnicima s teškim oboljenjima bubrega i srca!**

### Princip pregleda

Pregled crijeva sa optickim instrumentima omogucuje otkrivanje patoloskih promjena na debelom crijevu i najdonjem dijelu tankog crijeva. Pregled se obavlja pomocu instrumenta u obliku tanke cjevcice, koji se uvodi kod pacijenta u budnom stanju od crijevnog otvora do slijepog crijeva. Takvom metodom osvjetljavanja crijeva s unutrasnje strane, mogu se otkriti promjene na crijevima. Nadalje, postoji mogucnost istovremenog uzimanja probe tkiva, te odstranjivanja polipa (izbocene na sluznici). Pregled traje otprilike 45 minuta i u pravilu nije bolan odnosno evenutalno umjereno bolan.

**Molim Vas da se prilikom dolaska na pregled koristite sredstvima javnog prijevoza ili dodite u pratnji , kako bi Vam mogao prema potrebi dati sredstvo protiv bolova. Poslije takve injekcije niste vise toga dana sposobni sudjelovati u prometu.**

### Priprema za koloskopiju (opticki pregled debelog crijeva)

Kako bi opticki pregled crijeva bio uspjesan, crijeva moraju biti prije pregleda potpuno ispraznjena. Pri tome je bitno, da upute tocno slijedite. Tekucina /Colophos) namijenjena je iskljucivo praznjenju crijeva. Ne zadrzava se u tijelu i biva putem stolice potpuno izlucena. Srdstvo za ciscenje (Colophos) moze uzrokovati prolazni proljev.

### Dan prije pregleda

- |            |  |
|------------|--|
| do 14 sati | jesti samo hranu siromasnu vlaknom, kao npr. bijeli kruh, margarin, med, marmeladu ((bez komada voća), meso ribu sa bijelom rizom ili tjesteninu.  |
| od 14 sati | nista vise ne jesti, ali puno pitи. Bistru tekucinu, kao caj, kavu, mineralnu vodu bez ugljicnog dioksida, bistru juhu (bujon). Ne pitи <b>mljeko i mljecne proizvode</b> .                |
| u 17 sati  | popiti 1 bocicu Colophos-tekucine u jednom gutljaju. Poslije toga do 20 sati popiti najmanje 2 litre tekucine (caj, sirup, bujon, vodu bez ugljicnog dioksida). U toku noci pitи po zelji. |

### Na dan pregleda

- |           |   |
|-----------|---|
| u 06 sati | popiti 1 bocicu Colophos-tekucine u jednom gutljaju. Do 07,30 sati popiti najmanje 2 litre tekucine (caj, sirup, bujon ili vodu bez ugljicnog dioksida), potom pitи po zelji. |
|-----------|---|